

Antonin (6 ans) - Hypotonie axiale

Pour Antonin, le pédiatre avait constaté à partir de l'âge de 4 mois une hypotonie axiale importante, mais c'est seulement vers l'âge de 7 mois qu'il a commencé à avoir des évanouissements comme des pertes de connaissance, nous l'avons amené aux Urgences, il a subi des examens approfondis pendant une semaine et donc après 1 semaine d'examens il est sorti avec un traitement antiépileptique. Le diagnostic était un retard psychomoteur important.

On lui a introduit un traitement antiépileptique du Balporat de sodium ce qui a permis d'atténuer les crises, mais qui ne les a pas supprimées complètement, c'est à dire qu'Antonin avait des hauts et des bas, il y avait des périodes où il allait très bien, il y en avait d'autre où il était quand même fatigué et puis surtout il a continué à avoir des secousses très très importantes et très fortes, c'était comme des décharges électriques qui pouvait même le faire tomber par terre s'il était debout.

Nous avons découvert l'Association Stelior par des amis, nous avons introduit le changement alimentaire et après 3 mois de changements, Antonin a fortement diminué les crises de secousses qu'il avait et après 5 mois de changement alimentaire, ces crises et ces secousses ont totalement disparues.

C'est vrai qu'au niveau de sa présence, au niveau de son autonomie pour marcher, il a fait également des progrès puisqu'il peut marcher beaucoup plus longtemps, il répond quand on l'appelle, il est beaucoup plus présent.

Donc nous envisageons avec le Neurologue de supprimer progressivement ces traitements chimiques.